

Interrater-reliabilitet av svenska SCID-5-AMPD Del I och Del II - En Pilotstudie

Sophie Steijer, läkarexamen från Karolinska Institutet
Specialistläkare i psykiatri, Leg psykoterapeut, forskare, författare

Målsättning

- Förbättra diagnostik
- Hypotes 1: Är personlighetssyndrom underdiagnostiserat?
- Hypotes 2: Kan utredning med SCID-5-AMPD intervjun förbättra diagnostik?

Alternativ Modell för diagnostik av personlighetsyndrom i DSM-5


The interrater reliability of the Swedish version of the Structured Clinical Interview for the DSM-5 Alternative Model for Personality Disorders, Module I and Module II for diagnosing personality disorders among adults referred to specialized psychiatric care – a pilot study

Sophie Steijer ¹, Steinn Steingrímsson ^{1 2}, Niklas Meyerson ¹, Peter Sand ^{3 4 5}

Affiliations + expand

PMID: 41257765 PMCID: [PMC12670790](#) DOI: [10.1186/s12888-025-07615-4](#) 

Read free
full text at 

FREE
Full text 

ACTIONS

 Cite

 Collections

 Permalink

PAGE NAVIGATION

Studiepopulation

- Totalt 38 deltagare fullföljde studien.
- Rekrytering skedde från Göteborgsområdet.
- Deltagarna kom från en specialiserad öppenvårdsmottagning för personlighetsyndrom vid Sahlgrenska University Hospital.

Könsfördelning

Studien. Kvinnor 79% , Män 21%

På Psykiatriska mottagningen: Kvinnor 78%, Män 22%

Demografi hos deltagare

Totalt n = 38

Kön

- Kvinnor 30 (79%)
- Män 8 (21%)
- Medelålder (spann) 28,4 år [19–43]

Utbildning

- Grundskola 9 (24%)
- Gymnasium 20 (52%)
- Universitetsexamen 9 (24%)

Civilstånd

- Ensamhushåll 17 (45%)
- Sambo med partner 10 (26%)
- Sambo med annan person 11 (29%)

Sysselsättning

- Student 9 (24%)
- Yrkesverksam 16 (42%)
- Sjukskriven 13 (34%)

Personlighetssyndrom enligt SCID-II

Borderline personlighetssyndrom 16 (42%)

Personlighetssyndrom UNS 6 (16%)

Ängslig personlighetssyndrom 3 (8,2%)

Histrionisk personlighetssyndrom 1 (2,6%)


Schizoid personlighetssyndrom 1 (2,6%)

Dependent personlighetssyndrom 1 (2,6%)

Annan psykiatrisk problematik 10 (26%)

Personlighetssyndrom enligt SCID-II

n = 38



- Borderline personlighetssyndrom
- Personlighetssyndrom UNS
- Ängslig personlighetssyndrom
- Histrionisk personlighetssyndrom
- Schizoid personlighetssyndrom
- Dependent personlighetssyndrom
- Annan psykiatrisk problematik

Diagnostiska instrument

- SCID-5-AMPS Del I , Personlighetsfungerande : 12 st. delskalor , svårighetsgrad 0 - 4
- SCID-5-AMPD Del II , Personlighetsdrag: 5 st. områden och 25 st. personlighetsdrag

Resultat

Deltagare (n = 38)

Demografi

Samsjuklighet

Tolkning

Inter-rater reliabilitet SCID-5-AMPD Del I och Del II

Tabell


SCID-5-AMPD Del II	Bedömare 1 M	Bedömare 1 SD	Bedömare 1 α	Bedömare 2 M	Bedömare 2 SD	ICC	KI
Negativ emotionalitet	1.78	0.33	0.25	1.74	0.50	0.56	0.27 / 0.76
Distansering	1.73	0.45	0.63	1.34	0.69	0.51	0.13 / 0.74
Antagonism	1.41	0.50	0.73	0.70	0.69	0.29	-0.09 / 0.60
Disinhibition	1.40	0.56	0.66	1.18	0.78	0.49	0.21 / 0.70
Psykotisism	0.20	0.32	0.38	0.41	0.45	0.10	-0.17 / 0.37

SOPHIE STEIJER

Borderline
personlighetsyndrom



SYMPTOM, DIAGNOS OCH BEHANDLING

 **GOTHIA**
KOMPETENS

sophiesteijer@gmail.com

Tack !

